

エコー消エタP

開封日

年 月 日

エコー消エタP

エコー消エタP

エコー消エタP 第3類医薬品

2013年1月改訂

500mL

△【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【その他の注意】

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【成分】

100mL中

日本薬局方エタノール 83.0mL

添加物として日局ユーカリ油を微量含む

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

脱脂綿、ガーゼ等に浸して軽く塗る
(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(裏面に続く)

殺菌消毒薬

エコー消エタP

76.9~81.4vol%エタノール

500mL

第3類医薬品

アルコール類 水溶性
危険等級Ⅱ 火気厳禁

飲用不可



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

エコー消エタP 第3類医薬品

500mL

2. 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 合成ゴム、合成樹脂、光学器具、鏡器具、印刷面、塗装面、ワックス処理面等の変質を起こす場合があるので注意すること。

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-110
TEL.03-3381-2004
受付時間9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度の問合せ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

殺菌消毒薬

エコー消エタP

76.9~81.4vol%エタノール

第3類医薬品

500mL

火気厳禁

飲用不可



製造
番号
使用
期限



キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951