

外皮用薬

第3類医薬品

アクリノール・亜鉛華単軟膏「ヨシダ」P

Acrinol Zinc Oxide Ointment 「Yoshida」P

500g



4



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

2014年3月改訂

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 患部が広範囲の人。(4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】通常、1日1～数回適量を患部に塗布する

(用法・用量に関する注意) 1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。3. 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分・分量】本剤100g中、アクリノール水和物1g、酸化亜鉛10gを含む。添加物としてミツロウ、ダイズ油、濃グリセリンを含む。

【保管及び取扱い上の注意】1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2. 小児の手の届かない所に保管すること。3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【お問い合わせ先】吉田製薬株式会社 お客様相談室 電話 03-3381-2004

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

製造
番号



キャップ：PP
ボトル：PE
外装フィルム：PE

使用
期限