

去痰剤

セネガシロップ「メタル」

日本薬局方 セネガシロップ
Senega Syrup

500mL

製造番号



キャップ:PP

使用期限

外装フィルム:PP, PE

ガラス 瓶

発売元

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元

中北薬品株式会社
愛知県津島市白浜町字番場52-1

GS1 <調剤包装単位>



(01)04987288926016

GS1 <販売包装単位>



(01)14987288926259

※※2009年7月改訂(第5版)

貯法: 室温保存

※2008年10月改訂

使用期限: 容器に表示

日本標準商品分類番号	872231
承認番号	16000AMZ05828
薬価収載	1985年12月

販売開始	1986年1月
再評価結果	1981年8月

※※【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

【組成・性状】

組成

本剤1mL中、日局セネガ0.04gの10vol%エタノール抽出液を含む。

※添加物として白糖を含む。

製剤の性状

本剤は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチルのような特異なおいがあり、味は甘い。

【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰喀出困難

急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用法・用量】

セネガシロップとして、通常、成人1日10~35mLを3回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

※※(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム ノックピン シアナミド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

※※(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類/頻度	頻度不明
大量投与	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振

【薬効薬理】

咽頭などの粘膜刺激により気道液分泌を増加し、分泌された粘液の排出機能をも亢進し、去痰作用をあらわすと推定される。(サポニン)

【取扱い上の注意】

本剤は原料に天然物が含まれておりますので、その産地や採集時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがあります。

【文献請求先】

※中北薬品株式会社 製薬工場事業部
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1
TEL 0567-32-1431 FAX 0567-32-2961