

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

ポピコットン棒

指定医薬部外品 外皮消毒剤

1本入り×30



外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

1本入り×30

外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

1本入り×30


外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

1本入り×30

綿棒の取り出し方



綿棒をアルミの上から押さえていると切れません

1 切り口の矢印に沿ってアルミを切る

2 残ったアルミを切り口の矢印に沿って切る

3 アルミの上から綿棒をつまんで取り出す



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曾951

【用法・用量】

1日数回患部に塗布する。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

1包中
日本薬局方ポビドンヨード0.25g
綿棒1本
添加物としてラウロマクロゴール、グリセリン、乳酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、pH調整剤を含む
(10%ポビドンヨード液2.5mLを含む)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 開封後はすみやかに使用すること。

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間:9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



製造
番号
使用
期限



外皮消毒剤 指定医薬部外品

ポピコットン棒

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

1本入り×30

綿棒の取り出し方は裏面を参照してください

綿棒をアルミの上から押さえていると切れません



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曾951

△【使用上の注意】

☒ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が広範囲の人。
(3) 深い傷やひどいやけどの人。

☒ 相談すること
1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒