

※※2016年 5月改訂（第7版）
※2015年12月改訂（第6版）

ヘキサック®スクラブ

クロルヘキシジン製剤
手指用殺菌消毒薬

500mL

Scrub Hexizac

調剤

販売

日本標準商品分類番号
872619

承認番号 | 21200AMZ00601000
薬価収載 | 薬価基準対象外
販売開始 | 2001年 1月

貯法：遮光、室温保存
使用期限：ラベルに記載



401104987288155027



401114987288155253

製造番号
使用期限

下部側に記載



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

手指用殺菌消毒薬 ヘキサック®スクラブ 500mL

【禁忌（次の場合には使用しないこと）】
クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者

【組成・性状】

- 組成 本剤100mL中、日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液20mL（クロルヘキシジングルコン酸塩として4g）を含有する。添加物として、ラウロマクロゴール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ラウリン酸ジエタノールアミド、エタノール、ラウリルジメチルアミンオキシド液、pH調整剤、赤色102号、香料、その他2成分を含有する。
- 製剤の性状 本剤は、赤色澄明のやや粘性の液で、わずかに芳香がある。
pH:5.7～6.7 比重d₂₀²⁰:約1.02

【効能・効果】

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

【用法・用量】

- 術前、術後の術者の手指消毒の場合
手指及び前腕部を水でぬらし、本剤約5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流し、更に本剤約5mLで2分間洗浄をくりかえし、同様に洗い流す。
- 1.以外の医療従事者の手指消毒の場合
手指を水でぬらし、本剤約2.5mLを手掌にとり1分間洗浄後、流水で洗い流す。

【使用上の注意】

- 慎重投与（次の場合には慎重に使用すること）
薬物過敏症体質の者
- 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

※ キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS

手指用殺菌消毒薬 ヘキサック®スクラブ 500mL

（1）重大な副作用

ショック（0.1%未満）：ショックがあらわれることがあるので観察を十分に行い、悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

（2）その他の副作用

過敏症 発疹等（0.1～5%未満）
症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3.適用上の注意

- 投与経路 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
- 使用時 1)本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。

※※2)溶液の状態では長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

4.その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

- 経口投与しないこと。誤飲した場合には、牛乳、生卵、ゼラチン等を用いて、胃洗浄を行うなど適切な処理を行う。
- 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
- 本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
- 他の洗浄剤などと混ぜないこと。

【文献請求先】 吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10