

外用殺菌消毒剤

※2016年5月改訂（第6版）
2015年1月改訂（第5版）

日本標準商品分類番号

872619

貯 法：遮光した気密容器に入れ、室温保存
使用期限：ラベルに記載

【用法・用量】

化膿局所の消毒
0.05～0.2%の液として使用する。
含嗽
0.05～0.1%の液で含嗽する。

承認番号	(61AM)3922
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月
再評価結果	1983年4月

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
皮膚 注1)	塗布部の疼痛、発赤、腫脹等があらわれ、さらに潰瘍、壊死を生じる
過敏症 注2)	過敏症状

注1)症状があらわれた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

注2)症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

外用にのみ使用し、内服しないこと。

【取扱上の注意】

本剤で着色すると脱色しにくいので、必要以外のものに付着しないよう注意すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10



外装フィルム：PE 製造番号

ガラス：ボトル
金属：キャップ
ゴム：中 栓

使用期限

アクリノール0.2%液「ヨシダ」

滅菌製剤

500mL

0.2

調剤

販売



(01)04987288194019



(01)14987288194252

【組成・性状】

- 組成
アクリノール水和物 0.2%水溶液
- 性状
本剤は黄色澄明の液体である。

【効能・効果】

化膿局所の消毒
泌尿器・産婦人科術中術後、化膿性疾患
(癰、よう、扁桃炎、副鼻腔炎、中耳炎)
口腔領域における化膿局所の消毒



ヨシダ製薬

製造販売元

吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951