

【使用上の注意】**してはいけないこと**

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の部位には使用しないこと
- (1) 損傷のある皮膚。
 - (2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【成分】

1袋中

日本薬局方エタノール 56.1mL
医療脱脂綿 15g (4cm×4cm 50枚)
添加物として日局ユーカリ油を微量含む
(76.9~81.4vol%エタノール67.6mLを含む)

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる
(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので、使用上の問題はない。
6. 使用後はトイレに流さず、衛生的に処理すること。
7. 開封後はすみやかに使用すること。
8. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室

東京都中野区中央5-1-10

TEL.03-3381-2004

受付時間9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

消毒綿

第3類医薬品

エコ消エタ綿P[®]

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁

4cm×4cm 50枚



アルミパック

10個入

消毒綿

◀ 開封口

2016年9月改訂

第3類医薬品


エコ消エタ綿P[®]

76.9~81.4vol% エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁

4cm×4cm 50枚



アルミパック

10個入



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曾951

消毒綿

第3類医薬品


エコ消エタ綿P[®]

76.9~81.4vol% エタノール含浸綿



4 987288 010258

4cm×4cm 50枚



アルミパック

10個入

製造番号

使用期限



【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

【火気厳禁】

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

工口消エタ綿P

消毒綿

第3類医薬品

【成分】
1 液中
1 日本製エタノール 56.1 mL
2 アルミパック 50枚
3 消毒綿 4cm×4cm 50枚
4 エタノール含浸綿 50枚
5 包装紙 1枚
6 封入紙 1枚

【効能・効果】
76.9～81.4vol%エタノール含浸綿
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

【用法・用量】
そのままで使用してください。
（用法・用量に準ずる）
1. 小瓶に使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
2. アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
3. アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
4. アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
5. アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
6. アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
7. アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。

【保存及び取扱い上の注意】
1 直射日光の当たる場所に保管しないでください。
2 火気厳禁。
3 子供が手の届く場所に保管しないでください。
4 使用後は、必ず手を洗ってください。
5 使用後は、必ず手を洗ってください。
6 使用後は、必ず手を洗ってください。
7 使用後は、必ず手を洗ってください。

【その他の注意】
3 アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
4 アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
5 アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
6 アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。
7 アルミパックに使用できる場合は、消毒綿の指端を消毒綿の裏面に押しつけて使用してください。

【お問い合わせ先】
吉田製薬株式会社
〒595-8501 堺市東区南入道9-51
TEL: 073-3381-2004
FAX: 073-3381-2004
Eメール: info@yoshida-pharm.co.jp

