

まぜるな危険 酸性の洗浄・漂白剤、シクロソシアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険です。おやめください。

シクロソシアヌール酸ナトリウム製剤
シクロソシアヌール酸ナトリウム製剤
殺菌消毒薬 第2類医薬品



【効能・効果、用法・用量】

哺乳びん、乳首の消毒殺菌：水10L当たり本品1錠を溶かした液に1時間以上浸す。

(用法・用量に関連する注意)

- 1.定められた用法・用量を厳守してください。
- 2.液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。
- 3.金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラミン食器等には、本品の使用を避けてください。
- 4.調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

【成分及び分量】

本品1錠中ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム2.5g。添加物として、アジピン酸、炭酸水素ナトリウムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】


- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 3.衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。
- 4.殺菌消毒する製品によっては印刷面(文字、絵)、材質など変色・変質することがあります。

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



製造
番号

使用
期限



発売元  **ヨシダ製薬** 吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10
製造販売元  **日産化学工業株式会社**
東京都千代田区神田錦町3-7-1

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

- 本品は飲まないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。

【使用上の注意】

相談すること

- 1.本品をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。
- 2.目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。
- 3.本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。