

0.025%逆性石ケン綿球

(0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球)

販売名：塩ベ綿球

第3類医薬品

【製品の特徴】

本剤は、0.025w/v%ベンザルコニウム塩化物液と薬液を吸着しにくい綿球を併せて包装し、高圧蒸気滅菌処理した製品です。薬液含浸済ですので、開封後そのまま使用できます。

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書と製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 使用后、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合

【効能又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法及び用量】

本剤を1日数回、そのまま患部に塗布して用いる。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は1パックにつき1回の使用とし、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。

- (4) 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれたら、使用を中止してください。
- (5) 粘膜・創傷面又は炎症部位に長時間又は広範囲に使用しないでください(全身吸収による筋力弱さを起こすおそれがあります)。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 石けん類や血清、膿汁等が付着していると本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので十分に洗い落してから使用してください。
- (8) 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。

【成分及び分量】

本剤は、下記の成分を含有する。

成 分	溶液100mL中の分量
日局 濃ベンザルコニウム塩化物液 50	0.05mL (0.025w/v%)

添加物として、pH調整剤2剤を含む。
薬液の担体としてPET綿球を含む。
PET綿球 1gに対して薬液 11mL含浸。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光を避け、湿気の少ないなるべく涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用後は、トイレに流さないで、衛生的に処理してください。
- (4) 綿球、薬液等を継ぎ足して使用しないでください。
- (5) 誤用の原因となったり、品質が変わる可能性があるため、他の容器に入れ替えて使用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 本剤は、小売りの開封小分け販売はできません。

発売元



吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元



〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 ☎ 0120-149-931

お客様相談室 03-3381-2004

受付時間：9:00～17:00(土日、祝日を除く)

MADE IN JAPAN

外用消毒剤

第3類医薬品

滅菌済

0.025%逆性石ケン綿球

0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球

販売名：塩ベ綿球

0.025%

No.20×2球

プラカップ

20個入

JAN



4 987288 974017

外用消毒剤

第3類医薬品 滅菌済

0.025%逆性石ケン綿球

0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球

販売名：塩ベ綿球

0.025%

No.20×2球
プラカップ

20個入

No.20 2球入

発売元



ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10


製造販売元




白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12


使用方法 ※液ハネ注意!!



上ぶたをめぐって開封してください。
(4隅のどの位置からも開封可能です。)



ピンセット等を用いて
綿球を取り出してください。



そのまま患部に塗布して
用いてください。

- 開封後はすみやかにご使用ください。
- ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。



135×145×110

20個入

プラカップ

No.20×2球

0.025%

販売名：塩ベ綿球

0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球

0.025%逆性石ケン綿球

外用消毒剤 第3類医薬品 滅菌済

0.025%逆性石ケン綿球

(0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球)

販売名：塩ベ綿球

第3類医薬品

【製品の特徴】

本剤は、0.025w/v%ベンザルコニウム塩化物液と薬液を吸着しにくい綿球を併せて包装し、高圧蒸気滅菌処理した製品です。薬液含浸済ですので、開封後そのまま使用できます。

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書と製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりないう場合

【効能又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法及び用量】

本剤を1日数回、そのまま患部に塗布して用いる。

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は1パックにつき1回の使用とし、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。

- (4) 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれたら、使用を中止してください。
- (5) 粘膜・創傷面又は炎症部位に長時間又は広範囲に使用しないでください（全身吸収による筋脱力を起こすおそれがあります）。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- (7) 石けん類や血清、膿汁等が付着していると本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので十分に洗い落してから使用してください。
- (8) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【成分及び分量】

本剤は、下記の成分を含有する。

成 分	溶液100mL中の分量
日局 濃ベンザルコニウム塩化物液 50	0.05mL (0.025w/v%)

添加物として、pH調整剤2剤を含む。薬液の担体としてPET綿球を含む。PET綿球1gに対して薬液11mL含浸。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、湿気の少ないなるべく涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用後は、トイレに流さないで、衛生的に処理してください。
- (4) 綿球、薬液等を継ぎ足して使用しないでください。
- (5) 誤用の原因となったり、品質が変わる可能性があるため、他の容器に入れ替えて使用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 本剤は、小売りの開封小分け販売はできません。

外用消毒剤

第3類医薬品 滅菌済

0.025%逆性石ケン綿球

0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球

販売名：塩ベ綿球

0.025%

No.20×2球

プラカップ

20個入

JAN



発売元

ヨシダ製薬 吉田製薬株式会社

お客様相談室 03-3381-2004
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN

外用消毒剤

第3類医薬品 滅菌済

0.025%逆性石ケン綿球

0.025%ベンザルコニウム塩化物液含浸綿球

販売名：塩ベ綿球

0.025%

No.20×2球

プラカップ

20個入

No.20 2球入

発売元


ヨシダ製薬 吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元


白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12


使用方法 ※液ハネ注意!!



上ぶたをめくって開封してください。
(4隅のどの位置からも開封可能です。)



ピンセット等を用いて綿球を取り出してください。



そのまま患部に塗布して用いてください。

■開封後はすみやかにご使用ください。
■ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。

135×145×110

