

# エコ消エタ綿P

第3類医薬品

4cm×8cm 1枚入 **100包**

### 【使用上の注意】

してはならないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

### 【成分】

本剤は1包中、下記の成分を含有する。

成分	含有量
白烏 エタノール	1.2mL
医療脱脂綿 (4cm×8cm2つ折り 1枚)	0.32g

添加物として白烏ユーカリ油を微量含む。

(76.9～81.4vol%エタノール/1.4mLを含む)

### 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

### 【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる

(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

3. 外用にのみ使用すること。
4. 適度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。

5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので、使用上の問題は無い。
6. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。
7. 開封後はすみやかに使用すること。

 **ヨシダ**製薬

製造販売元  
**吉田製薬株式会社**  
埼玉県狭山市南入曽951

消毒綿

第3類医薬品

# エコ消エタ綿P

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm 1枚入 **100包**

火気厳禁

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室  
東京都中野区中央5-1-10  
TEL.03-3381-2004  
受付時間9:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

消毒綿

2017年9月改訂

第3類医薬品

# エコ消エタ綿P

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】  
手指・皮膚の消毒  
医療機器の消毒

4cm×8cm 1枚入 **100包**

火気厳禁

 **ヨシダ**製薬

消毒綿

第3類医薬品

# エコ消エタ綿P

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm 1枚入 **100包**

火気厳禁

製造番号

使用期限



火気厳禁

【効能・効果】  
手指・皮膚の消毒  
医療機器の消毒

4cm×8cm 1枚入  
100包

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

エーコー消エタ綿P

第3類医薬品

消毒綿

エーコー消エタ綿P 第3類医薬品

4cm×8cm 1枚入 100包

【使用上の注意】  
してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと  
(1) 損傷のある皮膚。  
(2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
関係部位 症状  
皮膚 発疹・発赤、かゆみ

【成分】  
本剤は1包中、下記の成分を含有する。

成分	含有量
目局 エタノール	1.2mL
医療脱脂綿 (4cm×8cm2つ折り 1枚)	0.32g

添加物として目局ユーカリ油を微量含む。  
(76.9～81.4vol%エタノール1.4mLを含む)  
【効能・効果】  
手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒  
【用法・用量】  
そのまま塗擦、清浄用として用いる  
(用法・用量に関連する注意)  
1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。  
2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。  
3. 外用にのみ使用すること。  
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。

5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。  
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落とししてから使用すること。  
【保管及び取扱い上の注意】  
1. 直射日光の当たらない所に保管すること。  
2. 小児の手の届かない所に保管すること。  
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)  
4. 火気に近づけないこと。  
5. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので、使用上の問題はない。  
6. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。  
7. 開封後はすみやかに使用すること。

製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入替951



ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社

消毒綿

第3類医薬品

エーコー消エタ綿P

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm 1枚入 100包

火気厳禁

お問い合わせ先  
吉田製薬株式会社 お客様相談室  
東京都中野区中央5-1-10  
TEL.03-3381-2004  
受付時間9:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

◀開封口

消毒綿

2017年9月改訂

第3類医薬品

エーコー消エタ綿P

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm 1枚入 100包

【効能・効果】  
手指・皮膚の消毒  
医療機器の消毒

火気厳禁

ヨシダ製薬

消毒綿

第3類医薬品

エーコー消エタ綿P

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm 1枚入 100包

火気厳禁

製造番号

使用期限



4 987288 010203



