

速乾性手指消毒薬 ベルコム[®]ローション
500mL

3. 適用上の注意

(1) 投与経路

手指消毒以外の目的には使用しないこと。

(2) 使用時

ア. 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。

イ. 引火性があるので、火気には注意すること。

4. その他の注意

本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の未熟児を取扱う場合、未熟児の皮膚がかぶれることがあるので十分に注意すること。

【薬効薬理】

1. 広範囲な抗微生物スペクトルを有し、グラム陽性・陰性菌、MRSA、結核菌、真菌及び一部のウイルスに有効とされている。

2. 生物学的同等性

ベルコムローションと標準製剤の殺菌効果を減菌率法にて検討した結果、両剤の生物学的同等性が確認された¹⁾。

【取扱上の注意】

安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75% 6カ月)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ベルコムローションは通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された²⁾。

【主要文献】

1) 吉田製薬社内資料

2) 吉田製薬社内資料

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10
TEL 03-3381-2004
FAX 03-3381-7728



ポンプ:PP
キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS

ベルコム[®]ローション

速乾性手指消毒薬

500mL ※

火気厳禁

アルコール類(エタノール)
水溶性 危険等級II 火気厳禁


【注意】希釈せず、
原液のまま使用すること。

日本標準商品分類番号	
872619	

承認番号	(06AM)0199
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	1994年4月

貯法: 避光した気密容器に入れ、
火気を避けて室温保存
使用期限: ラベルに記載

製造
番号
使用
期限



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

Belicom
Lotion

400

300

200

100

速乾性手指消毒薬 ベルコム[®]ローション
500mL

【組成・性状】

- 組成 本剤100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.2gを含む。添加物としてエタノール、トリイソオクタン酸グリセリン、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、香料を含む。
- 製剤の性状 本剤はエタノールを含有する無色澄明な液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

【用法・用量】

- 医療従事者の通常の手指消毒の場合
本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落とした後、本剤による消毒を行う。
- 術前・術後の術者の手指消毒の場合
手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落とした後、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
(1) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
(2) 損傷のある手指には使用しないこと(本剤はエタノールを含有するので、損傷部位への使用により刺激作用を有する)。
(3) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類・頻度	5%以上又は頻度不明
過敏症 ³⁾	紅斑、痒疹等、浮腫等
皮膚 ³⁾	刺激症状

注) 症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

ベルコム[®]ローション

速乾性手指消毒薬 ベルコム[®]ローション 500mL

3.適用上の注意

- (1)投与経路
手指消毒以外の目的には使用しないこと。
- (2)使用時
ア.石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。
イ.引火性があるので、火気には注意すること。

4.その他の注意

本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の未熟児を取扱う場合、未熟児の皮膚がかぶれることがあるので十分に注意すること。

【薬効薬理】

- 1.広範囲な抗微生物スペクトルを有し、グラム陽性・陰性菌、MRSA、結核菌、真菌及び一部のウイルスに有効とされている。
- 2.生物学的同等性
ベルコムローションと標準製剤の殺菌効果を滅菌率法にて検討した結果、両剤の生物学的同等性が確認された¹⁾。

【取扱上の注意】

安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75% 6カ月)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ベルコムローションは通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された²⁾。

【主要文献】

- 1) 吉田製薬社内資料
- 2) 吉田製薬社内資料

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10
TEL 03-3381-2004
FAX 03-3381-7728



ポンプ:PP
キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

開封日

年 月 日

※2018年3月改訂(第6版)
2015年1月改訂(第5版)

ベルコム[®]ローション

速乾性手指消毒薬

500mL ※ **火気厳禁**



製造
番号
使用
期限

アルコール類(エタノール)
水溶性 危険等級II 火気厳禁

【注意】希釈せず、
原液のまま使用すること。

日本標準商品分類番号
872619

承認番号 (06AM)0199
薬価収載 薬価基準対象外
販売開始 1994年4月

貯法:遮光した気密容器に入れ、
火気を避けて室温保存
使用期限:ラベルに記載

Belcom Lotion

400

300

200

100

ベルコム[®]ローション

速乾性手指消毒薬 ベルコム[®]ローション 500mL

【組成・性状】

- 1.組成 本剤100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.2gを含む。
添加物としてエタノール、トリイソオクタン酸グリセリン、N-コイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、香料を含む。
- 2.製剤の性状 本剤はエタノールを含有する無色澄明な液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

【用法・用量】

- 1.医療従事者の通常の手指消毒の場合
本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落とし、その後、本剤による消毒を行う。
- 2.術前・術後の術者の手指消毒の場合
手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落とし、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
(1)本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
(2)損傷のある手指には使用しないこと(本剤はエタノールを含有するので、損傷部位への使用により刺激作用を有する)。
(3)眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類・頻度	5%以上又は頻度不明
過敏症 ³⁾	紅斑、痒痒感、浮腫等
皮膚 ³⁾	刺激症状

注)症状があらわれた場合には、使用を中止すること。