

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位 症 状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【成分】

1包中 日局 エタノール1.4mL
医療脱脂綿 0.32g(4cm×4cm 1枚)
(76.9～81.4vol%エタノール1.7mLを含む)

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる

(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので使用上の問題はない。
6. 開封後はすみやかに使用すること。
7. 使用後はトイレに流さず、衛生的に処理すること。

【お問い合わせ先】

吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間9：00～17：00
(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度の問合せ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

4cm×4cm
1枚入

210包

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×4cm
1枚入

火気厳禁

210包



4 987288 007203

製造
番号
使用
期限



4 987288 007203

ヨシダ

消毒綿 第3類医薬品

ヨシダ

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

4cm×4cm
1枚

火気厳禁



 **ヨシダ**製薬

ヨシダ

第3類医薬品 消エタ綿PE「ヨシダ」

ヨシダ

【成分】1包中

日局 エタノール 1.4mL

医療脱脂綿 0.32g(4cm×4cm 1枚)

(76.9～81.4vol%エタノール1.7mLを含む)

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる

使用に際しては、外箱の記載をお読み下さい。



PE,金属

 **ヨシダ**製薬

製造販売元

吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×4cm
1枚入
210包

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁

4cm×4cm
1枚入
210包

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

YOSHIDA 製薬

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×4cm
1枚入
210包

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁

4cm×4cm
1枚入
210包

紙

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×4cm
1枚入
210包

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁

4cm×4cm
1枚入
210包

2018年10月改訂

YOSHIDA 製薬

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×4cm
1枚入
210包

消毒綿

第3類医薬品

消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁

4cm×4cm
1枚入
210包

4 987288 007203

製造
番号
使用
期限

【成分】
1 水中 日局 エタノール 1.4mL
医療用脱脂綿 0.32g(4cm×4cm 1枚)
(76.9～81.4vol%エタノール 1.7mLを含む)

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】
そのまゝ少量に潤湿して用いる

【使用上の注意】
1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
3. 外用のみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. アルコール成分が皮膚を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は加温湯汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【保管及び取扱上の注意】
1 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2 小児の手の届かない所に保管すること。
3 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる)。
4 火気に近づけないこと。
5 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので使用上の問題はなし。
6 開封後はすみやかに使用すること。
7 使用後はトナリに流さないで、衛生的に処理すること。

【お問い合わせ先】
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間 9：00～17：00
(土、祝日を除く)

【画作用被毒救済制度の問合せ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_comp/index.html
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

【使用上の注意】
1. 使用しないこと。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 外用のみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. アルコール成分が皮膚を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は加温湯汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【火気厳禁】
医療機器の消毒
手指・皮膚の消毒

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】
そのまゝ少量に潤湿して用いる

【使用上の注意】
1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 外用のみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. アルコール成分が皮膚を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は加温湯汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【使用上の注意】
1. 使用しないこと。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 外用のみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. アルコール成分が皮膚を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は加温湯汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】
そのまゝ少量に潤湿して用いる

【使用上の注意】
1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 外用のみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. アルコール成分が皮膚を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は加温湯汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【使用上の注意】
1. 使用しないこと。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 外用のみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. アルコール成分が皮膚を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は加温湯汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】
そのまゝ少量に潤湿して用いる

【使用上の注意】
1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 外用のみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. アルコール成分が皮膚を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は加温湯汁等を十分に洗い落としから使用すること。