

ドラッグインフォメーション

平成 24 年 4 月改訂

販売名	アクリノール・チンク油「ヨシダ」	製造販売元	吉田製薬株式会社							
局方名	日本薬局方 アクリノール・チンク油									
洋名	Acrinol and Zinc Oxide Oil	発売年月	1963 年 4 月							
一般名	アクリノール・チンク油	薬価収載年月	1963 年 4 月							
剤形	軟膏剤	薬価	1g 6.50	健保適用						
規制区分	普通薬	日本標準商品分類番号	872649							
厚生労働省薬価基準収載医薬品コード		2649803X1015	YJコード	2649803X1031						
性状	黄白色の泥状物で、長く静置するとき成分の一部を分離する。									
組成	本品 1000g中に、アクリノール水和物 10g、チンク油 990gを含む。 添加物としてポリソルベート 20 を含有する。									
効能効果	小範囲の第一度熱傷及び擦傷、小範囲の湿疹・皮膚炎における水疱・膿疱									
用法用量	通常、1日 1～数回、適量を患部に塗布する。									
薬理作用	アクリノールは、各種化膿菌、特にレンサ球菌、ウェルシュ菌、ブドウ球菌、淋菌に対し、静菌及び殺菌作用がある。作用機序は、生体でアクリジニウムイオンとなり細胞の呼吸酵素を阻害するといわれている。 本品は、チンク油にアクリノールを配合したもので、殺菌、防腐、収れん作用を有する。 本品は、アクリノール・亜鉛華軟膏に比べ、局所乾燥作用がすぐれている。									
使用上の注意	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>【禁忌（次の部位には使用しないこと）】 重度又は広範囲の熱傷</p> </div> <p>1. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>種類\頻度</td> <td>頻度不明</td> </tr> <tr> <td>過敏症<sup>注)</sup></td> <td>過敏症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚<sup>注)</sup></td> <td>発疹、刺激感等</td> </tr> </table> <p>注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。</p> <p>2. 適用上の注意 (1) 眼には使用しないこと (2) 頻回、多量に使用するときは、その上に冷湿布を行うことが望ましい。</p>				種類\頻度	頻度不明	過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状	皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等
種類\頻度	頻度不明									
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状									
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等									
取扱上の注意	貯 法: 遮光した気密容器に入れ、室温保存する。 その他: 本品で着色すると脱色しにくいので、必要以外のものに付着しないよう注意すること。									
備考	包装単位: 500g	文献 請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央 5-1-10 TEL 03-3381-2004							