

ドラッグインフォメーション

平成 26 年 3 月改訂

販売名	アクリノール・亜鉛華単軟膏「ヨシダ」P	製造販売元	吉田製薬株式会社						
洋名	Acrinol Zinc Oxide Ointment 「Yoshida」 P								
一般名	1%アクリノール・10%酸化亜鉛軟膏	発売年月	昭和 63 年 2 月						
剤形	軟膏剤	規制区分	一般用医薬品	医薬品銘柄コード (一般用医薬品コード)	264N00A00005				
性状	黄色で特異なおいがある。								
組成	本品 100g中、アクリノール 1g、酸化亜鉛 10gを含む。 添加物として、ミツロウ、ダイズ油、濃グリセリンを含む。								
効能効果	切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒								
用法用量	<p>通常、1日1～数回適量を患部に塗布する</p> <p>(用法・用量に関する注意)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>定められた用法を守ること。</li> <li>小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。</li> <li>本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。</li> </ol>								
薬理作用	<p>アクリノールは、各種化膿菌、特にレンサ球菌、ウェルシュ菌、ブドウ球菌、淋菌に対し、静菌及び殺菌作用がある。作用機序は、生体でアクリジニウムイオンとなり細胞の呼吸酵素を阻害するといわれている。</p> <p>亜鉛華単軟膏は収れん・消炎・保護・緩和な防腐作用を持つ。</p>								
使用上の注意	<ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。 <ol style="list-style-type: none"> <li>今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人。</li> <li>患部が広範囲の人。</li> <li>深い傷やひどいやけどの人。</li> <li>医師の治療を受けている人。</li> </ol> </li> <li>次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。 <ol style="list-style-type: none"> <li>使用後、次の症状があらわれた場合 <table border="1" data-bbox="386 1563 895 1641"> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </table> </li> <li>数日間使用しても症状の改善が見られない場合</li> </ol> </li> </ol>					関係部位	症状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	症状								
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ								
保管及び取扱い上の注意	<ol style="list-style-type: none"> <li>直射日光を避け、涼しい所に保管すること。</li> <li>小児の手の届かない所に保管すること。</li> <li>他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)</li> </ol> <p>使用期限:3年</p>								
備考	包装単位:500g	文献請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10 TEL 03-3381-2004						