

# ドラッグインフォメーション

平成 28 年 4 月改訂

販売名	苦味チンキ「東豊」	発売	吉田製薬株式会社						
局方名	日本薬局方 苦味チンキ	製造販売	東豊薬品株式会社						
洋名	Bitter Tincture	発売年月	1961年1月						
一般名	苦味チンキ	薬価収載年月	1961年1月						
剤形	液剤	薬価	10ml 18.10	健保適用					
規制区分	普通薬	日本標準商品分類番号	872333						
厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	2333001X1286	YJコード	2333001X1286						
禁忌	【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(相互作用の項参照)								
性状	黄褐色の液で、特異な芳香があり、味は苦い。 比重 $d_{20}^{20}$ : 約 0.90								
組成	本剤 1000ml 中に、トウヒ粗末 50g、センブリ粗末 5g、サンショウ粗末 5g 各々の抽出液を含む。 添加物としてエタノールを含む。								
効能・効果・用法・用量	矯味・矯臭の目的で調剤にもちいる。 また、苦味健胃剤の調剤にもちいる。								
薬理作用	芳香と苦味による反射作用と、辛味成分による胃腸粘膜の刺激作用によって、唾液、胃液などの消化液の分泌を促し、消化管の運動亢進して食欲を増進させる。 芳香苦味健胃薬として消化不良、食欲不振などに他剤と配合して用いる。								
使用上の注意	1.相互作用 (1)併用禁忌(併用しないこと)								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジスルフィラム ノックピン シアミナド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩</td> <td>これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。</td> <td>本剤はエタノールを含有しているため。</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	ジスルフィラム ノックピン シアミナド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子							
ジスルフィラム ノックピン シアミナド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。							
	(2)併用注意(併用に注意すること)								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール</td> <td>これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。</td> <td>本剤はエタノールを含有しているため。</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子							
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。							
取扱上の注意	1.生薬による抽出剤であるため、多少色調が変化することがある。 2.生薬製剤の常として、多少の沈殿を生じることがある。  貯 法: 気密容器にいれ、火気を避けて保存。 使用期限: ラベルに記載(3年)								
備考	エタノール含有製剤 アルコール類 水溶性 火気厳禁 危険等級Ⅱ 包装単位: 500ml	文献 請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10 TEL(03)3381-2004						