

ドラッグインフォメーション

平成 28 年 4 月改訂

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------------|----------|--|-------|------|--------|------|-------|---------|
| 販売名 | 酸化亜鉛「ヨシダ」 | | 製造販売 | 吉田製薬株式会社 | | | | | | | |
| 局方名 | 日本薬局方 酸化亜鉛 | | | | | | | | | | |
| 洋名 | Zinc Oxide | 発売年月 | 昭和36年1月 | | | | | | | | |
| 一般名 | 酸化亜鉛 | 薬価収載年月 | 昭和36年1月 | | | | | | | | |
| 剤形 | 外用散剤 | 薬価 | 10g 24.10 | 健保適用 | | | | | | | |
| 規制区分 | 普通薬 局方 | 日本標準商品分類番号 | 872649 | | | | | | | | |
| 厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード | 2649708X1257 | YJコード | 2649708X1257 | | | | | | | | |
| 性状 | <p>本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。 水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。 希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。 空气中で徐々に二酸化炭素を吸収する。</p> | | | | | | | | | | |
| 組成 | 酸化亜鉛 99.0%以上を含む。 | | | | | | | | | | |
| 効能 効果 | 軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防腐 | | | | | | | | | | |
| 用法 用量 | 外用散剤(散布剤)として 15～100% 軟膏剤・液剤(懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等)として 2～60% 上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1～数回患部に適用する。 | | | | | | | | | | |
| 薬理 作用 | 本品は局所収れん作用保護作用及び軽度の防腐作用を有する。創傷面又は潰瘍面に散布すると、散布場所を乾燥し、分泌、細菌の繁殖を抑制する。 | | | | | | | | | | |
| 使用 上の 注意 | <p>禁忌【次の部位には使用しないこと】 1. 重度又は広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕 2. 患部が湿潤している場合</p> <p>1. 副作用 本在は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <table border="1"> <tr> <td>種類\頻度</td> <td>頻度不明</td> </tr> <tr> <td>過敏症 注)</td> <td>過敏症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚 注)</td> <td>発疹、刺激感等</td> </tr> </table> <p>注) このような症状が現れた場合には使用を注意すること。</p> <p>2. 適用上の注意 使用時 (1) 誤って吸入しないよう注意させること。 (2) 眼には使用しないこと。</p> | | | | | 種類\頻度 | 頻度不明 | 過敏症 注) | 過敏症状 | 皮膚 注) | 発疹、刺激感等 |
| 種類\頻度 | 頻度不明 | | | | | | | | | | |
| 過敏症 注) | 過敏症状 | | | | | | | | | | |
| 皮膚 注) | 発疹、刺激感等 | | | | | | | | | | |
| 取扱上の注意 | 貯 法: 気密容器 包 装: 500g | | | | | | | | | | |
| 文献請求先 | 吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10 | | | | | | | | | | |