

第3類医薬品

速乾性手指消毒薬

エタハンドローション

76.9~81.4vol%エタノール

新発売

ローション状の
速乾性手指
消毒薬



ヨシダ製薬

特 徴

- エタノール濃度は日局消毒用エタノールと同じです。
- 殺菌作用が迅速です。
- 広範囲の細菌、一部の真菌・ウイルスに対して幅広い抗微生物スペクトルを示します。
- 手荒れを防止する目的で保湿剤を配合しました。
- 容器ごと交換するため微生物汚染や濃度低下の心配がありません。

速乾性手指消毒薬

第3類医薬品

エタハンドローション

Etahand Lotion ●76.9~81.4vol%エタノール

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等の改訂にご留意下さい。



手指・皮膚



飲用不可



火気厳禁

貯 法：直射日光を避け密栓し

火気を避けて保存

使用期限：3年(容器等に記載)

区 分	一般用医薬品
日本標準商品分類番号	872615
承 認 番 号	22200APX00609000
販 売 開 始	2010年 11月

成 分

本剤100mL中日局エタノール83mL
 添加物としてグリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリスオクタン酸グリセリン、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステル-DL-ピロリドンカルボン酸塩、香料を含む。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

手指の皮膚の治療を受けている人。

2. 次の部位には使用しないこと

損傷のある手指、唇等の粘膜の部分、目の周り。
 (局所刺激作用があります。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 今までに薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

(2) 医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

手指・皮膚の消毒

用法・用量

本品をそのまま消毒部位に塗布または塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。
4. 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない場所に、密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。
 (誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
6. 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

2010年11月作成

包装規格

品 名	サイズ 縦×横×高(mm)	重 量	梱包入数	JANコード
エタハンドローション ポリ 500mL	個装 72 × 72 × 180 外装 378×245×192	475g 5.2kg	10	4 987288 114017



ヨシダ製薬

製造販売元

吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951

Y's Square <http://www.yoshida-pharm.com/>

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社
 東京都中央区中央5-1-10
 Tel: 03-3381-2004
 受付時間9:00~17:00
 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 ☎0120-149-931(フリーダイヤル)

①1011KK
400108