

外皮用殺菌消毒剤

第3類医薬品

# プッシュ綿棒P

10%ポビドンヨード液+綿棒



No.13  
薬液量 5.0mL

No.12  
薬液量 1.5mL



吉田製薬株式会社

# 特 長

プッシュ綿棒Pは綿棒と外皮用殺菌消毒剤である10%ポビドンヨード液を別ポケットにて包装した製品です。使用前に綿棒を薬液ポケットに“プッシュ”することにより10%ポビドンヨード液を含ませ、使用できます。

**衛生的** 個包装で使い切りタイプです。

綿棒の軸部分に10%ポビドンヨード液がつかみません。

**消毒に適した薬液量**


1回分が包装されており無駄がありません。

**携帯に便利**


個包装ですので携帯に適しております。

## 綿棒の取扱い方法


以下のようにして薬液を含浸させて、開封してください。薬液と綿棒が見える向きに持ち、綿棒を押し込んでください。




1 綿棒を両方で押さえるように持つ




2 綿棒を薬液側に押込む




3 フィルムを左右に剥がす



4 綿棒を取出す



5 消毒部分の内側から外側へ円を描くように塗布する



外皮用殺菌消毒剤 **第3類医薬品**

# プッシュ綿棒P

10%ポビドンヨード液 + 綿棒

貯 法：直射日光の当たらない涼しい所に保管

使用期限：2年(包装等に記載)

区 分	一般用医薬品
日本標準商品分類番号	872612
承認番号	21700APZ01119000
販売開始	2011年4月

### 成分及び分量

プッシュ綿棒Pの液は、1mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	ポビドンヨード	100mg(有効ヨウ素として10mg)
添加物	ラウロマクロゴール、リン酸水素ナトリウム、クエン酸	

### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品等を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

### 効能・効果

切り傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒。とびひ、おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

### 用法・用量

1日数回患部に塗布してください。

- (1) 小児に使用する場合には、保護者の監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

### 保管及び取扱い上の注意

使用期限 2年(包装等に記載)

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。
- (5) 開封後はすみやかに使用すること。

2011年4月作成

### 包装規格

品 名	サイズ縦×横×高(mm)	重量・総重量	梱包入数	JANコード
プッシュ綿棒P 1本入り×24	No.12 個装 100×90×250 外装 520×270×385 (1包 245×31×15)	197.5g 4.7kg (1包 5g)	20	4 987288 950110
	No.13 個装 125×100×250 外装 655×270×425 (1包 245×40×20)	326g 7.5kg (1包 9g)		4 987288 950028

お問い合わせ先



発売元 **吉田製薬株式会社**  
東京都中野区中央5-1-10  
Y's Square <http://www.yoshida-pharm.com/>

製造販売元



**ハクゾウメディカル株式会社**  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10  
Tel: 03-3381-2004  
受付時間9:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)