

# 逆性石ケン液0.01 「ヨシダ」

開封日

年 月 日

# 逆性石ケン液0.01 「ヨシダ」

500mL

販売

外用殺菌消毒剤

2015年1月改訂(第4版)

滅菌製剤

# 逆性石ケン液0.01 「ヨシダ」

0.01% Benzalkonium Chloride Solution  
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

調剤

500mL

0.01%



製造  
番号  
使用  
期限

製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曾951

キャップ:PP  
ボトル:PP  
ラベル:PS  
ゴム:ゴム栓

202006

500mL

外用殺菌消毒剤

500mL

日本標準商品分類番号 872616	承認番号 21000AMZ00151000
貯法:室温保存 使用期限:ラベルに記載	薬価収載 1998年 7月
	販売開始 1998年 7月
	再評価結果 1982年 8月

### 【組成・性状】

- 1.組成  
ベンザルコニウム塩化物0.01%<sup>1)</sup>Λ%
- 2.製剤の性状  
本剤は無色～淡黄色澄明の液で、特異なにおいがある。

### 【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手術部位(手術野)の粘膜の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
感染皮膚面の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
結膜囊の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。

### 【使用上の注意】

- 1.副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

【過敏症 注） 発疹、掻痒感等の過敏症状（頻度不明）

注）このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

### 2.適用上の注意

- (1)人体
- 1)投与経路:経口投与しないこと。洗眼には使用しないこと。
  - 2)使用時  
ア.皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。  
イ.粘膜、創傷面又は炎症部位に長時間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある)。  
ウ.密封包帯、ギプス包帯、バックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

滅菌製剤

# 逆性石ケン液0.01 「ヨシダ」

0.01% Benzalkonium Chloride Solution  
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

### (2)その他

#### 1)調製方法

繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。

#### 2)使用時

- ア.血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。  
イ.石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。  
ウ.皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

### 【薬効薬理】

本剤はグラム陽性菌、陰性菌及び真菌には有効であるが、結核菌及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。

### 【取扱上の注意】

本剤は滅菌製剤なので、開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

### 【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部  
東京都中野区中央5-1-10