

# 逆性石ケン液0.025 「ヨシダ」

開封日

年 月 日

# 逆性石ケン液0.025 「ヨシダ」

500mL

販売

外用殺菌消毒剤

2015年1月改訂(第5版)

滅菌製剤

# 逆性石ケン液0.025 「ヨシダ」

0.025% Benzalkonium Chloride Solution  
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

調剤

500mL

0.025%



ヨシダ製薬

製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曾951

キャップ:PP  
ボトル:PP  
ラベル:PS  
ゴム:ゴム栓

202006

500mL

外用殺菌消毒剤

500mL

滅菌製剤

# 逆性石ケン液0.025 「ヨシダ」

0.025% Benzalkonium Chloride Solution  
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

日本標準商品分類番号	承認番号	(06AM)0261
872616	薬価収載	1994年 3月
貯法:室温保存	販売開始	1994年 5月
使用期限:ラベルに記載	再評価結果	1982年 8月

### 【組成・性状】

- 組成  
ベンザルコニウム塩化物0.025<sup>W</sup>/v%
- 製剤の性状  
本剤は無色～淡黄色澄明の液で、特異なにおいがある。

### 【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手術部位(手術野)の粘膜の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。
皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
感染皮膚面の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.02～0.025%溶液を用いる。
腔洗浄	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。
結膜囊の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。

### 【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
  - 本剤は濃度に注意して使用すること。
  - 炎症又は易刺激性の部位(粘膜、陰股部等)に使用する場合は、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
  - 本剤を希釈して使用する場合は、精製水を使用して調製後滅菌処理すること。
- 副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
- 過敏症注) 発疹、痒感等の過敏症状(頻度不明)  
注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。
- 適用上の注意
  - 人体
    - 投与経路:経口投与しないこと。洗眼には使用しないこと。

- 使用時
  - 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。
  - 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある)。
  - 密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。
- その他
  - 調製方法  
繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下にならないように注意すること。
  - 使用時  
ア、血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。  
イ、石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。  
ウ、皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。