

ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」

開封日

年 月 日

ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」

ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」

ハイポエタノール液2%「ヨシダ」500mL

日本標準商品分類番号	承認番号	22000AMX00328000
872619	薬価収載	2008年6月
	販売開始	2008年6月

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

【組成・性状】

1.組成

本剤1000mL中に、日局チオ硫酸ナトリウム水和物20gを含む。添加物として日局エタノール650mL、pH調整剤を含む。

2.性状

本剤は無色澄明な液で特異臭がある。

【効能・効果】

皮膚面及び手術器具類・布類に付着したヨードチンキ類のヨウ素の脱色、消毒

【用法・用量】

ヨードチンキ塗布による皮膚面(手術部位及び手術者の皮膚)及び手術用器具類・布類に付着したヨウ素の脱色並びに消毒剤として塗布又は洗浄等にそのまま使用

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1)本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
- (2)本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には直ちによく水洗すること。
- (3)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること(エタノール蒸気に大量または繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。)

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
次のような副作用が認められた場合には、使用を中止する。

販売

※2018年1月改訂(第4版)
外用用殺菌消毒剤 2015年1月改訂(第3版)

ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」

500mL ※ **火気厳禁**

2%

貯法:気密容器に保存する(直射光、火気を避けて保存)。
使用期限:ラベルに記載

 **ヨシダ**製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

ハイポエタノール液2%「ヨシダ」500mL

種類・頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止すること。

3.適用上の注意

- (1)投与経路
外用にのみ使用すること。
- (2)使用時
 - 1)同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 2)本剤は血清、膿汁等のタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。
 - 3)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので注意すること。
 - 4)本剤はアルコールを含有するため、火気に注意すること。

【薬効薬理】

生物学的同等性
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」と標準製剤を殺菌時間を評価する方法および殺菌効力のみられる希釈倍数を評価する方法にて検討した結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

【取扱上の注意】

- 1.結晶が析出した場合には少し温めて溶解する。
- 2.安定性試験
最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6か月)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ハイポエタノール液2%「ヨシダ」は通常の市場の流通下において3年間安定であることが推測された。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10



キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS

外用用殺菌消毒剤

ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」

調剤
販売包装単位用バーコードは区別なし表示

(01)04987288144014

500mL

2%

火気厳禁

製造
番号
使用
期限

 **ヨシダ**製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951