

# 逆性石ケン液0.05 「ヨシダ」

開封日

年 月 日

500mL

販売

外用殺菌消毒剤 2015年1月改訂(第4版)

# 滅菌製剤 逆性石ケン液0.05 「ヨシダ」

0.05% Benzalkonium Chloride Solution  
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

調剤 500mL 0.05%



CO1104987288187011

製造  
番号  
使用  
期限



ヨシダ製薬

製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951

キャップ:PP  
ボトル:PP  
ラベル:PS

ゴム:ゴム粒

202007

# 逆性石ケン液0.05 「ヨシダ」

500mL

外用殺菌消毒剤

500mL

日本標準品分類番号	承認番号	(08AM)0268
872616	薬価収載	1996年 3月
	販売開始	1996年 6月
貯法:室温保存	再評価結果	1982年 8月
使用期限:ラベルに記載		

### 【組成・性状】

- 組成  
ベンザルコニウム塩化物0.05<sup>W</sup>/v%
- 製剤の性状  
本剤は無色～淡黄色澄明の液で、特異なにおいがある。

### 【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手指・皮膚の消毒	適量石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンザルコニウム塩化物0.05%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。
手術部位(手術野)の粘膜の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。
皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。
感染皮膚面の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.05%溶液を布片で塗布・清拭するか、または塗擦する。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	ベンザルコニウム塩化物0.02～0.05%溶液を用いる。
腔洗浄	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.05%溶液を用いる。
結膜囊の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.05%溶液を用いる。

### 【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
  - 1) 本剤は濃度に注意して使用すること。
  - 2) 炎症又は易刺激性の部位(粘膜、陰股部等)に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
  - 3) 本剤を希釈して使用する場合は、精製水を使用して調製後滅菌処理すること。
- 2.副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症注)	発疹、瘙痒感等の過敏症状(頻度不明)
-------	--------------------

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

### 滅菌製剤

# 逆性石ケン液0.05 「ヨシダ」

0.05% Benzalkonium Chloride Solution  
日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

- 3.臨床検査結果に及ぼす影響  
本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

### 4.適用上の注意

- (1)人体
  - 1) 投与経路:経口投与しないこと。洗滌には使用しないこと。
  - 2) 使用時  
ア.皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。  
イ.粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋力を起こすおそれがある)。  
ウ.密封包帯、ギプス包帯、パッドに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。
- (2)その他
  - 1) 調製方法  
繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。