

第3類医薬品

速乾性手指消毒薬  
エタハンドローション  
500mL

【成分】

本剤100mL中、日局エタノール83mL  
添加物としてグリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、香料を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管すること。
- 2.小児の手の届かない所に保管すること。
- 3.他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- 4.火気に近づけないこと。
- 5.本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する可能性があるので注意すること。
- 6.使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室  
東京都中野区中央5-1-10  
TEL.03-3381-2004  
受付時間9:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

キャップ:PP  
ボトル:PE  
ラベル:PS

202008

開封日

年 月 日

2019年4月改訂

第3類医薬品

速乾性手指消毒薬  
エタハンド  
ローション  
Etahand Lotion

500mL

飲めません

火気厳禁

第4類  
アルコール類  
(エタノール)  
水溶性  
危険等級Ⅱ



製造  
番号  
使用  
期限



製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951

第3類医薬品

速乾性手指消毒薬  
エタハンドローション  
500mL

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の人は使用しないこと  
手指の皮膚の治療を受けている人。
- 2.次の部位には使用しないこと  
(1) 損傷のある皮膚。  
(2) 目の周囲、粘膜等。  
(局所刺激作用があります。)

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位 症 状  
皮膚 発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布または塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 2.目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 3.外用にのみ使用すること。
- 4.血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

目安

400

300

200

100