

2018年10月改訂(第6版)
※2017年7月改訂(第5版)

外用殺菌消毒剤

薬価基準未収載

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒
手術部位(手術野)の皮膚の消毒
医療機器の消毒

日本標準商品分類番号
872615

承認番号 21800AMX10570000
薬価収載 薬価基準未収載
販売開始 2007年9月

火気厳禁

4cm×8cm (2つ折り) **100包**
1枚入

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

4cm×8cm(2つ折り) 1枚入 **100包**

貯法：遮光した気密容器に入れ、
火気を避けて保存
使用期限：箱に記載

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

【組成・性状】

1. 組成

成分・含量	担体	含浸量
本溶液 100mL中、 日局エタノール 83mL	医療脱脂綿	医療脱脂綿 22.2g あたり本溶液 100mL

(1包中76.9～81.4vol%エタノール1.44mLを含む)

2. 性状

本品に含浸している液は無色澄明な液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本剤をそのまま消毒部位に塗布する

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 本剤が眼に入らないように注意すること。
入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。

(2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。(エタノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。)

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類・頻度 頻度不明 注) このような症状が
過敏感注) 発疹等 あらわれた場合には
皮膚注) 刺激症状 使用を中止すること。

3. 適用上の注意

(1) 投与経路: 外用にのみ使用すること。

(2) 使用時

1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

2) 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

るので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装力デーテル等には、変質するものがあるので注意すること。

4) 本剤は、引火性、爆発性があるため、火気に注意すること。また電気メスを使用する場合は、乾燥させてから使用すること。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、真菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

開封後は速やかに使用すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
〒164-0011 東京都中野区中央5-1-10
TEL 03-3381-2004

製造販売元
ヨシダ製薬 吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

◀ 開封口

外用殺菌消毒剤

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒
手術部位(手術野)の皮膚の消毒
医療機器の消毒

4cm×8cm **100包**
(2つ折り)
1枚入

火気厳禁

ヨシダ製薬

202006

外用殺菌消毒剤

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9～81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm (2つ折り)
1枚入

製造番号

使用期限

100包

火気厳禁

4cm×8cm (2つ折り) 1枚入
100包

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21800AMX10670000
薬価収載	薬価基準未収載
販売開始	2007年9月

※**火気厳禁**

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
手術部位(手術野)の皮膚の消毒
医療機器の消毒

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

外用殺菌消毒剤

薬価基準未収載

※2017年7月改訂(第5版)
2018年10月改訂(第6版)

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

4cm×8cm (2つ折り) 1枚入 100包

貯法：遮光した気密容器に入れ、
火気を避けて保存
使用期限：箱に記載

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

【組成・性状】

1.組成

成分・含量	担体	含浸量
本溶液100mL中、 日高エタノール 83mL	医療脱脂綿	医療脱脂綿 22.2g あたり本溶液 100mL

(1包中76.9~81.4vol%エタノール1.44mLを含む)

2.性状

本品に含浸している液は無色澄明な液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本剤をそのまま消毒部位に塗布する

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

(1)本剤が眼に入らないように注意すること。入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。

(2)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[エタノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明	注
過敏症注)	発疹等	皮膚注)	このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.適用上の注意

(1)投与経路:外用にのみ使用すること。

(2)使用時

1)同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

2)本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあ

るので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落とすこと。

3)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので注意すること。

4)本剤は、引火性、爆発性があるため、火気に注意すること。また電気メスを使用する場合は、乾燥させてから使用すること。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、真菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

開封後は速やかに使用すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
〒164-0011 東京都中野区中央5-1-10
TEL 03-3381-2004

製造販売元
ヨシダ製薬 吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

外用殺菌消毒剤

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm
(2つ折り)

※**火気厳禁**

1枚入
100包



外用殺菌消毒剤

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
手術部位(手術野)の皮膚の消毒
医療機器の消毒

※**火気厳禁**

◀ 開封口

4cm×8cm
(2つ折り)
1枚入
100包

ヨシダ製薬

外用殺菌消毒剤

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

4cm×8cm
(2つ折り)

※**火気厳禁**

1枚入
100包

製造番号
使用期限

ロウゼ

外用殺菌消毒剤

ロウゼ

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

76.9～81.4vol% エタノール含浸綿

【効能・効果】
 手指・皮膚の消毒
 手術部位(手術野)の
 皮膚の消毒
 医療機器の消毒

4cm×8cm
 (2つ折り)
 1枚入



火気厳禁



ヨシダ製薬

ロウゼ

消毒用エタノール綿「ヨシダ」4×8

【組成】

成分・含量	担体	含浸量
本溶液100mL中、 日局エタノール 83mL	医療脱脂綿	医療脱脂綿 22.2g あたり本溶液 100mL

(1包中76.9～81.4vol%エタノール1.44mLを含む)

【用法・用量】

本剤をそのまま消毒部位に塗布する
 使用に際しては、外箱の記載をよくお読みください。



ヨシダ製薬

製造販売元
 吉田製薬株式会社
 埼玉県狭山市南入曽951



(01)04987288017028



PET,金属

ロウゼ



(01)04987288017028