

使用期限：
製造番号：

日本薬局方 第2類医薬品
グリセリン
Glycerin

第2類医薬品

日本薬局方 100mL

グリセリン

Glycerin

グリセリン「コザカイ・P」
ひび・あかざれ 洗腸剤

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)

この外箱の説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要とき読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

日本薬局方 100mL

グリセリン

Glycerin

グリセリン「コザカイ・P」
ひび・あかざれ 洗腸剤

使用上の注意 (外用)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 瀉薬やたれひのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

使用上の注意 (洗腸用)

してはいけないこと

適用しないでください。[常用すると、効果が減弱(いわゆる「なれ」が生じ)薬剤にたよりがちになります。]

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。) (3) 1歳未満の乳児 (4) 高齢者 (5) 次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血 (6) 次の診断を受けた人 心臓病
2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

次の症状があらわれることがあります。
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

効能・効果

(外 用) ひび・あかざれ
(洗腸用) 便秘

用法・用量

(外 用) 脱脂綿・ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。
(洗腸用) 本剤を常水で2倍に希釈し、洗腸器を用いて直腸内に注入する。注入量は希釈後の溶液の量として次の通りとする。

12歳以上	1回 30mL
6歳以上12歳未満	1回 20mL
1歳以上6歳未満	1回 10mL
1歳未満	1回 5mL

1回量を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入する。

発売元 吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10
製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

発売元 吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10
製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

<用法・用量に関する注意>

(外 用)

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用のみ使用し、内服しないでください。
(洗腸用)
- 定められた濃度に希釈して、よくかき混ぜてください。
- 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてください。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 特に乳幼児の場合には、安易な使用を避け、洗腸にたよりにすぎないよう注意してください。
- 洗腸にのみ使用してください。
- 洗腸器を無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。

便秘しがちな人のために

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行ってください。
- 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけてください。(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など)
- 適度な運動、腰部マッサージなどを行うよう心がけてください。
- 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意をもよおすくなります。

成分

本品はグリセリン(C₃H₈O₃:92.09)として84.0～87.0%含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 希釈するための容器は清潔なものを使用してください。(洗腸)
- 使用残液は捨ててください。(洗腸)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931

<吉田製薬お客様相談室>
電話: 03-3381-2004
受付時間: 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)



紙 外箱 キャップ: PP
容器: PE