

使用に際しては、裏面の記載をよくお読みください。

消毒綿

第3類医薬品

# 消エタ綿PE「ヨシダ」

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

## 【注意】

1. 次の部位には使用しないこと
  - (1) 損傷のある皮膚。
  - (2) 目の周囲、粘膜等。
2. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
3. 使用に際しては裏面の記載をよく読むこと。
4. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
5. 火気に近づけないこと。

4cm×4cm **100枚**

## 【成分】

1パック中 日局 エタノール 100.5mL  
 医療脱脂綿22.4g(4cm×4cm100枚)  
 (76.9~81.4vol%エタノール121.1mLを含む)  
 お問い合わせ先  
 吉田製薬株式会社 お客様相談室  
 TEL.03-3381-2004

副作用救済制度 ☎0120-149-931

火気厳禁

開封日

年 月 日



開封前に、一度だけ容器を逆さまにし脱脂綿部分を軽く押すと、薬液が脱脂綿全体に含浸されます。その後、気密フィルムをはがしてご使用ください。



ヨシダ製薬

製造販売元

吉田製薬株式会社  
 埼玉県狭山市南入曽951



4 987288 007210



容器  
フィルム  
外装



紙ラベル

製造  
番号  
使用  
期限

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の部位には使用しないこと
- (1) 損傷のある皮膚。
  - (2) 目の周囲、粘膜等。

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 関連部位 症状

皮膚	発疹・発赤、かゆみ
----	-----------

### その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

### 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

### 【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる  
(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。

万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

3. 外用にのみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としから使用すること。

### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので使用上の問題はない。
6. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。
7. 開封後はすみやかに使用すること。
8. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。