

寄生性皮膚疾患剤

# 10%サリチル酸 ワセリン軟膏東豊

10%Salicylic Acid Ointment

## 6.適用上の注意

- (1) 長期間使用していても症状の改善が認められない場合には、改めて診断し適切な治療を行うことが望ましい。
- (2) 広範囲の病巣に使用した場合には、副作用があらわれやすいので注意して使用すること。
- (3) 眼科用には使用しないこと。

## 【取扱上の注意】

31℃以上の高温下に長時間放置したとき、成分の一部が表面に析出することがある。

## 【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部

製造番号

使用期限

調剤



(01)04987288946014

販売



(01)14987288946257

寄生性皮膚疾患剤

# 10%サリチル酸 ワセリン軟膏東豊

# 10%

10%Salicylic Acid Ointment

## 500g

貯法：気密容器、室温保存  
 使用期限：製造の翌月から5年  
 注意：取扱上の注意の項参照

## 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤に対して過敏症の既往歴のある患者

日本標準商品分類番号	872652
承認番号	14300AMZ01479
薬価収載	1968年12月
販売開始	1969年1月
再評価結果	1977年10月

2008年6月改訂(第4版)  
 (GS1コード追加)  
 2005年5月改訂(第3版)  
 (薬事法改正による表示変更)

## 【組成・性状】

組成:1g中 サリチル酸100mg  
 白色ワセリン900mg  
 添加物としてBHTを含む。

性状:本剤は白色～微黄色の軟膏である。

## 【効能・効果】

乾癬、白癬、(頭部浅在性白癬、小水疱性斑状白癬、汗疱状白癬、頑癬)、癬風、紅色靴糠疹、紅色陰癬、角化症(尋常性魚鱗癬、先天性魚鱗癬、毛孔性苔癬、先天性手掌足底角化症(腫)、ダリエー病、遠山連圈状靴糠疹)、湿疹(角化を伴う)、口囲皮膚炎、掌蹠膿疱症、ヘブラ氏靴糠疹、アトピー性皮膚炎、痤瘡、癩、腋臭症、多汗症、その他角化性の皮膚疾患。

【用法・用量】成人1日1～2回塗布する。

## 【使用上の注意】

### 1.重要な基本的注意

患部が化膿しているなど湿潤、びらんが著しい場合には、あらかじめ適切な処置を行ったのち使用すること。

寄生性皮膚疾患剤

# 10%サリチル酸 ワセリン軟膏東豊

10%Salicylic Acid Ointment

## 2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

## その他の副作用

種類/頻度	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>注)</sup>	発赤、紅斑
長期・大量使用	内服、注射等全身的投与の場合と同様な副作用があらわれることがある。

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

## 3.高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので注意して使用すること。

## 4.妊婦・産婦・授乳婦等への投与

経口投与による動物実験で催奇形作用が報告されているので、妊婦または妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合のみ使用すること。

## 5.小児等への投与

小児等では副作用が発現し易いので慎重に使用すること。

容器:PE  
 キャップ:PP  
 パッキン:PE  
 外装フィルム:PE



## ヨシダ製薬

発売元  
 吉田製薬株式会社  
 東京都中野区中央5-1-10

製造販売元  
 東豊薬品株式会社  
 東京都葛飾区西新小岩4-15-3