

開封日
年 月 日

※※2017年10月改訂（第6版）
※2016年 5月改訂（第5版）

速乾性手指消毒薬

ヘキサック[®]ローション

Hexizac lotion

クロルヘキシジン製剤

1L

調剤

販売



(01)04987288116035



(01)14987288116308

火気厳禁

日本標準商品分類番号
872619

承認番号 (08AM) 0334
薬価収載 薬価基準対案外
販売開始 2002年11月

貯法: 遮光した気密容器に入れ、
火気を避けて保存
使用期限: ラベルに記載

製造
番号
使用
期限

ヨシダ[®]製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

ヘキサック[®]ローション

1L

【禁忌(次の場合には使用しないこと)】

- 1. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者
- 2. 膣、膀胱、口腔等の粘膜面(クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。)
- 3. 損傷皮膚及び粘膜(エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により刺激作用を有する。)

【組成・性状】

- 1. 組成 本剤100mL中、クロルヘキシジングルコン酸塩0.2gを含む。
添加物として、エタノール、トリイソオクタン酸グリセリン、N-コイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩を含む。
- 2. 性状 本剤はエタノールを含有する無色澄明の液で特異な臭いを有する。

【効能・効果】

手指の消毒

【用法・用量】

本剤をそのまま用いる。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の場合には慎重に使用すること)

- (1) 薬物過敏症の既往歴のある者
- (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者

2. 重要な基本的注意
※※(1) ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。

(2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

※※(1) 重大な副作用

ショック(0.1%未満)、アナフィラキシー(頻度不明): ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

800

600

400

200

速乾性手指消毒薬

速乾性手指消毒薬

ヘキサック[®]ローション

Hexizac lotion

クロルヘキシジン製剤

1L

火気厳禁

アルコール類(エタノール)
水溶性 危険等級II 火気厳禁

【注意】希釈せず、原液のまま使用すること。

ヨシダ[®]製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

ヘキサック[®]ローション

1L

(2) その他の副作用
頻度不明

過敏症 1)	発疹、蕁麻疹等
皮膚 2)	刺激症状

- 1) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。
- 2) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

4. 適用上の注意

(1) 投与経路

手指消毒以外の目的には使用しないこと。

(2) 使用時

- 1) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
- 2) 引火性・爆発性があるため、火気には十分注意すること。

※(3) 溶液の状態では長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【薬効薬理】

ヘキサックローションは、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、セラチア、カンジダを30秒以内ですべて殺菌した。

【取扱上の注意】

- 1. 血清・膿汁等の有機性物質が付着している場合は、十分洗い落としてから使用すること。
- 2. 予備洗浄に石けんを用いた場合は石けん分を十分洗い落としてから使用すること。
- 3. 本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
- 4. 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場所があるので注意すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10



ボンブ:PP
キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS

開封日
年 月 日

※※2017年10月改訂（第6版）
※2016年 5月改訂（第5版）

速乾性手指消毒薬

ヘキサック[®]ローション

Hexizac lotion

クロルヘキシジン製剤

1L

調剤

販売

火気厳禁

日本標準商品分類番号
872619

承認番号 (08AM) 0334
薬価収載 薬価基準対象外
販売開始 2002年11月

貯法: 遮光した気密容器に入れ、
火気を避けて保存
使用期限: ラベルに記載

製造
番号
使用
期限

YOSHIDA 吉田製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

ヘキサック[®]ローション

1L

【禁忌(次の場合には使用しないこと)】
※※ 1. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者
2. 腔、膀胱、口腔等の粘膜面(クロルヘキシジン製剤の上記部
位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発
現が報告されている。)
3. 損傷皮膚及び粘膜(エタノールを含有するので、損傷皮膚及
び粘膜への使用により刺激作用を有する。)

【組成・性状】

1. 組成 本剤100mL中、クロルヘキシジングルコン酸塩0.2g
を含む。
添加物として、エタノール、トリンソクタン酸グリセ
リン、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-
ピロリドンカルボン酸塩を含む。
2. 性状 本剤はエタノールを含有する無色透明の液で特異な
臭いを有する。

【効能・効果】

手指の消毒

【用法・用量】

本剤をそのまま用いる。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の場合には慎重に使用すること)

(1) 薬物過敏症の既往歴のある者
(2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者
2. 重要な基本的注意

※※ (1) ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用
に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往
歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
(2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査
を実施していない。

※※ (1) 重大な副作用

ショック(0.1%未満)、アナフィラキシー(頻度不明):
ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるの
で、観察を十分に行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等
があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置
を行うこと。

800

600

400

200

速乾性手指消毒薬

速乾性手指消毒薬

ヘキサック[®]ローション

Hexizac lotion

クロルヘキシジン製剤

1L

火気厳禁

アルコール類(エタノール)
水溶性 危険等級Ⅱ 火気厳禁

【注意】希釈せず、原液のまま使用すること。

YOSHIDA 吉田製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

ヘキサック[®]ローション

1L

(2) その他の副作用
頻度不明

過敏症 1)	発疹、蕁麻疹等
皮膚 2)	刺激症状

1) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用
を中止し、再使用しないこと。

2) このような症状があらわれた場合には、使用を中止す
ること。

4. 適用上の注意

(1) 投与経路
手指消毒以外の目的には使用しないこと。

(2) 使用時

1) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意す
ること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
2) 引火性・爆発性があるため、火気には十分注意す
ること。

※ 3) 溶液の状態では長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化
学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与によりショック症
状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキ
シジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【薬効薬理】

ヘキサックローションは、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、
大腸菌、緑膿菌、セラチア、カンジダを30秒以内ですべて殺
菌した。

【取扱上の注意】

1. 血清・膿汁等の有機性物質が付着している場合は、十分洗い
落としてから使用すること。

2. 予備洗浄に石けんを用いた場合は石けん分を十分洗い落と
してから使用すること。

3. 本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂
白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白に
は過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。

4. 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色
する場合がありますので注意すること。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部
東京都中野区中央5-1-10



ポンプ:PP
キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS