

外用殺菌消毒剤

日本標準商品分類番号

872612

# ヨードチンキ「東豊」

劇

## Iodine Tincture

### 日本薬局方 ヨードチンキ

# 500mL

第二石油類 水溶性  
危険等級Ⅲ 火気厳禁



## ヨシダ製薬

発売元

吉田製薬株式会社

東京都中野区中央5-1-10

製造販売元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩4-15-3

2010年3月改訂(第3版)  
(指定医薬品区分廃止に伴う変更)  
2008年7月改訂(第2版)  
(局方名、販売名併記)

規制区分：劇薬  
貯法：気密容器  
火気を避けて保存  
使用期限：ラベルに記載

承認番号	16000AMZ05478
薬価収載	2008年7月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1983年4月

【禁忌(次の患者には使用しないこと)】

ヨード過敏症の患者

【組成・性状】

1. 組成

本剤1000mL中にヨウ素60gを含む。

添加物としてエタノール、ヨウ化カリウムを含有。

2. 性状

本剤は暗赤褐色の液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】

1. 皮膚表面の一般消毒

2. 創傷・潰瘍の殺菌・消毒

3. 歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒

【用法・用量】

5～10倍に希釈し、1日2～3回患部及び皮膚に適量塗布する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

(2) 粘膜、創傷面または炎症部位に長期間または広範囲に使用しないこと。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	ヨード疹等
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響  
血漿蛋白結合ヨード(PBI)及び甲状腺放射性ヨード摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。

4. 適用上の注意

(1) 人体

1) 使用部位

外用にのみ使用し、内服しないこと。

2) 使用時

ア. 深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

イ. 同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を伴う急性の皮膚炎をおこすことがあるので注意すること。

ウ. 口腔内に使用するときには、患部を乾燥させて塗布すること。

(2) その他

使用時：エタノールを含有するので、火気には注意すること。

5. 取扱上の注意

配合変化：マーキュロクロム液とは沈澱を生じる。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部



キャップ：PP

パッキン：PE

キャップシール：PS

ガラス：瓶

製造番号

使用期限

調剤



(01)04987288112013

販売



(01)14987288112256