

2018年7月改訂

第2類医薬品

【用法・用量に関連する注意】

- 1.定められた用法・用量を厳守してください。
- 2.換気のよい場所で使用してください。
- 3.液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。
- 4.金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びん・バスマシ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラミン食器等には、本品の使用を避けてください。
- 5.調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

【成分及び分量】

本品1g中 ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム 500mg。添加物として、炭酸水素ナトリウム、コハク酸を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かないところに保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 4.衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。
- 5.殺菌消毒する製品によっては印刷面(文字、絵)、材質など変色・変質することがあります。



お問い合わせ先  
吉田製薬株式会社 お客様相談室  
東京都中野区中央5-1-10  
TEL.03-3381-2004  
受付時間9:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)



キャップ:PP  
ボトル:PE  
ラベル:PET  
スプーン:PS

製造番号

01

使用期限

殺菌消毒薬

ジクロシア®

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム製剤  
500g



発売元



ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元

日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

第2類医薬品

殺菌消毒薬

ジクロシア®

500g

**まぜるな危険** 酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険です。おやめください。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

- 本品は飲まないでください。
- 手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。

【使用上の注意】

相談すること

- 1.本品をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。
- 2.目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。
- 3.本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果、用法・用量】

効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒殺菌	水2L当たり本品1gを溶かした液に1時間以上浸す。
医療器具の消毒	水1L当たり本品1~2gを溶かした液に数分間浸すか、清拭する。
器具・物品などの消毒	水1L当たり本品1~2gを溶かした液に数分間浸すか、清拭する。
室内・便所・浴室の消毒	水1L当たり本品1~2gを溶かした液で清拭する。

(本品1g:添付のスプーン1杯)