

第3類医薬品

速乾性手指消毒薬
エタハンドローション
500mL

【成分】

本剤100mL中日局エタノール83mL
添加物としてグリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタ
ン酸グリセリン、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-
ピロリドンカルボン酸塩、香料を含む。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管すること。
- 2.小児の手の届かない所に保管すること。
- 3.他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が
変わる。）。
- 4.火気に近づけないこと。
- 5.本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色す
る場合があるので注意すること。
- 6.使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PS

開封日

年 月 日

2019年4月改訂

第3類医薬品

速乾性手指消毒薬
エタハンド
ローション
Etahand Lotion

500mL

飲めません

火気厳禁

第4類
アルコール類
(エタノール)
水溶性
危険等級II



製造
番号
使用
期限



製造販売元
ヨシダ製薬 吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

第3類医薬品

速乾性手指消毒薬
エタハンドローション
500mL

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の人は使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
- 2.次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。
(局所刺激作用があります。)

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布または塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 2.目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 3.外用にのみ使用すること。
- 4.血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

400

300

200

100