

ドラッグインフォメーション

2022年4月改訂

販売名	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	製造販売	吉田製薬株式会社							
局方名	日本薬局方 亜鉛華軟膏									
洋名	Zinc Oxide Ointment	発売年月	1961年1月							
一般名	亜鉛華軟膏	薬価収載年月	1961年1月							
剤形	軟膏剤	薬価	10g 22.90	健保適用						
規制区分	普通薬 局方	日本標準商品分類番号	872649							
厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	2649704M1015	YJコード	2649704M1180							
性状	本剤は白色である。									
組成	本剤 1000g中 酸化亜鉛 200gを含有する。 添加物として、流動パラフィン、サラシミツロウ、セスキオレイン酸ソルビタン、白色ワセリン、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。									
効能効果	下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐 外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門 痒症、白癬、面皰、せつ、よう その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面									
用法用量	通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦または貼付する。									
薬理作用	局所に軽度の刺激を与えて血行を良くしまた組織を軟化し、弱い鎮痛効果を現すが、静菌・防腐作用は微弱である。 局所の収れん、分泌物の減少、上皮の形成などの作用を有する。									
使用上の注意	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 禁忌(次の部位には使用しないこと) 重度または広範囲な熱傷 </div> 1. 副作用 本剤は使用成績等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>種類\頻度</td> <td>頻度不明</td> </tr> <tr> <td>過敏症^{注)}</td> <td>過敏症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚^{注)}</td> <td>発疹、刺激等</td> </tr> </table> 注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。				種類\頻度	頻度不明	過敏症 ^{注)}	過敏症状	皮膚 ^{注)}	発疹、刺激等
種類\頻度	頻度不明									
過敏症 ^{注)}	過敏症状									
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激等									
取扱上の注意	貯 法: 気密容器(1～30℃)									
文献請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10									