

# 使用上の注意改訂のお知らせ

2020年5月  
吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央5-1-10

## 制酸剤

日本薬局方 沈降炭酸カルシウム

# 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」

## 制酸剤

日本薬局方 沈降炭酸カルシウム錠

# 炭カル錠「ヨシダ」250mg

# 炭カル錠「ヨシダ」500mg

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品につきまして、**使用上の注意**を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。(自主改訂)

なお、流通在庫の関係から改訂添付文書が封入された製品がお手元に届くまで若干の日時を要しますので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

—記—

### 1. 改訂内容(改訂箇所抜粋) 自主改訂による改訂: \_\_\_\_部 追記箇所

改訂後			改訂前		
<b>【使用上の注意】</b> 2. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			<b>【使用上の注意】</b> 2. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジギタリス製剤 ・ジゴキシン ・ジギトキシン等	略	略	活性型ビタミンD製剤 ・アルファカルシドール ・カルシトリオール ビタミンD	略	略
大量の牛乳	略	略	大量の牛乳	略	略
活性型ビタミンD製剤 ・アルファカルシドール ・カルシトリオール ビタミンD	略	略	ジギタリス製剤 ・ジゴキシン ・ジギトキシン等	略	略
ロキサデュスタット	ロキサデュスタットと併用した場合、ロキサデュスタットの作用が減弱するおそれがあるため、併用する場合は、前後1時間以上あけて本剤を服用すること。	ロキサデュスタットを酢酸カルシウムと同時投与したところ、ロキサデュスタットのAUC <sub>inf</sub> が低下した。			

### 2. 改訂理由

#### ○自主改訂

ロキサデュスタットの【使用上の注意】相互作用「併用注意」の項に『多価陽イオンを含有する経口薬剤(カルシウム、鉄、マグネシウム、アルミニウム等を含む製剤)』の記載があるため、追記いたしました。また、「併用注意」の表の順番を、他社の沈降炭酸カルシウム製剤に合わせて変更いたしました。

改訂内容につきましては医薬品安全対策情報(DSU) No.289(2020年6月)に掲載される予定です。

改訂添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)、又は吉田製薬株式会社ホームページ(<https://www.yoshida-pharm.com/>) 医療関係者向けヨシダ製薬製品情報サイトをご覧ください。

製造販売元



吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951