

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

効能追加および使用上の注意改訂のお知らせ

2017年9月
吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

殺菌消毒薬

第2類医薬品

ジクロシア ジクロシア 0.5g錠

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム製剤

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品について、「医療器具の消毒、器具・物品などの消毒、室内・便所・浴室の消毒」の効能・効果、用法・用量が追加承認されました。また、使用上の注意についても改訂を致しましたのでご案内申し上げます。

なお、改訂後の内容が記載された製品がお手元に届くまでには若干の日数を要しますので、今後のご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

—記—

改訂内容（下線 部追記）

1. 効能・効果、用法・用量

1) ジクロシアの効能・効果、用法・用量

改訂後（新）（下線 部追記）		改訂前（旧）	
効能・効果	用法・用量	効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒 殺菌	水2L当たり本品1g を溶かした液に1時間 以上浸す。	哺乳びん・乳首の消毒 殺菌	水2L当たり本品1g を溶かした液に1時間 以上浸す。
<u>医療器具の消毒</u>	<u>水1L当たり本品1～ 2gを溶かした液に数 分間浸すか、清拭す る。</u>		
<u>器具・物品などの消毒</u>	<u>水1L当たり本品1～ 2gを溶かした液に数 分間浸すか、清拭す る。</u>		
<u>室内・便所・浴室の消毒</u>	<u>水1L当たり本品1～ 2gを溶かした液で清 拭する。</u>		

2) ジクロシア 0.5g 錠の効能・効果、用法・用量

改訂後（新）（下線_____部追記）		改訂前（旧）	
効能・効果	用法・用量	効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒 殺菌	水 2 L 当たり本品 1 錠 を溶かした液に 1 時間 以上浸す。	哺乳びん・乳首の消毒 殺菌	水 2 L 当たり本品 1 錠 を溶かした液に 1 時間 以上浸す。
<u>医療器具の消毒</u>	<u>水 1 L 当たり本品 1 ～ 2 錠を溶かした液に数 分間浸すか、清拭す る。</u>		
<u>器具・物品などの消毒</u>	<u>水 1 L 当たり本品 1 ～ 2 錠を溶かした液に数 分間浸すか、清拭す る。</u>		
<u>室内・便所・浴室の消毒</u>	<u>水 1 L 当たり本品 1 ～ 2 錠を溶かした液で清 拭する。</u>		

2. 使用上の注意

1) 用法・用量に関連する注意（ジクロシア、ジクロシア0.5g錠共通）

改訂後（新）（下線_____部追記）	改訂前（旧）
<ol style="list-style-type: none"> 定められた用法・用量を厳守してください。 <u>換気の良い場所で使用してください。</u> 液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラニン食器等には、本品の使用を避けてください。 調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。 	<ol style="list-style-type: none"> 定められた用法・用量を厳守してください。 液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラニン食器等には、本品の使用を避けてください。 調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

2) 相談すること（ジクロシア、ジクロシア0.5g錠共通）


改訂後（新）（変更なし）	改訂前（旧）
<p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本品をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。 2. 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。 3. 本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 	<p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本品をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。 2. 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。 3. 本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


3) 保管及び取扱い上の注意（ジクロシア、ジクロシア0.5g錠共通）

改訂後（新）（下線_____部追記）	改訂前（旧）
<ol style="list-style-type: none"> 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管してください。 <u>2. 小児の手の届かないところに保管してください。</u> 3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる） 4. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。 5. 殺菌消毒する製品によっては印刷面（文字、絵）、材質など変色・変質することがあります。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管してください。 2. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる） 3. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。 4. 殺菌消毒する製品によっては印刷面（文字、絵）、材質など変色・変質することがあります。

改訂後の最新添付文書は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)及び吉田製薬株式会社ホームページ (<http://www.yoshida-pharm.com/>)「医療関係者向けヨシダ製薬製品情報サイト」にも掲載されています。併せてご利用ください。

発売元  **吉田製薬株式会社**
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元  **日産化学工業株式会社**
東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

発売元  **吉田製薬株式会社**
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元  **日産化学工業株式会社**
東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1